ỦY BAN NHÂN DÂN **THỊ TRẤN ĐAK PƠ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 28 /UBND-ĐC Về việc hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn	*Đak Pơ, ngày 26 tháng 01 năm 2022*

Kính gửi:

- Công chức Địa chính - Xây dựng - ĐT&MT thị trấn;
- Trưởng các Tổ dân phố, Trưởng các làng.

Để chủ động trong công tác phòng trừ bệnh khảm lá virus hại sắn ngay từ đầu vụ có hiệu quả cao. UBND thị trấn hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ chống bệnh khảm lá virus hại sắn như sau:

1. Triệu chứng và nguyên nhân gây hại

Triệu chứng: Là vết bệnh vàng loang lổ trên lá, cây bị nặng lá bị biến dạng, cong queo và nhăn nhúm, triệu chứng của bệnh là xuất hiện tất cả các giai đoạn của cây sắn.

Nguyên nhân: Bệnh khảm lá do virus Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCM) hiện nay chưa có thuốc đặc trị bệnh do virus.

2. Phương pháp lan truyền và cách phát hiện bênh khảm lá virus

Bệnh lan truyền qua từ hom giống lấy từ cây nhiễm bệnh, virus tiếp tục nhân lên từ hom giống nhiễm bệnh và tồn tại trong thân, lá, củ.

Bệnh lan truyền qua côn trùng môi giới, virus lan truyền qua bọ phấn trắng, bọ phấn trắng khi chích hút cây sắn bị bệnh sẽ nhiễm virus vào trong cơ thể, sau đó truyền qua cây khỏe trong quá trình chích hút.

Bọ phấn trắng là côn trùng đa thực gây hại trên nhiều loại cây trồng như: bầu bí, cà chua, khoai tây, ớt, canh dây,..

Sử dụng hom giống nhiễm bệnh là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nguồn bênh lây lan và nặng hơn sau mỗi vụ.

3. Biện pháp phòng trừ

Biện pháp canh tác:

Chọn loại giống kháng bệnh và ít bị nhiễm bệnh như KM94 nhiễm nhẹ hơn các giống khác, không được trồng giống HLS11 nhiễm bệnh nặng.

Sử dụng hom giống sạch bệnh, giống có nguồn gốc rõ ràng, không được sử dụng giống có triệu chứng nhiễm bệnh khảm lá đem trồng.

Luân canh cây trồng: không trồng sắn hoặc cây ký chủ của bọ phấn trắng ở những khu vực bị nhiễm bệnh khảm lá ít nhất 1 năm.

Không được xuống giống sắn trên khu vực cánh đồng, còn diện tích bị nhiễm bệnh khảm lá nhằm hạn chế bệnh tiếp tục lây lan và gây hại.

Phòng trừ môi giới truyền bệnh bọ phấn trắng: sử dụng bẩy dính màu vàng treo trên đồng ruộng để dự báo sự xuất hiện của bọ phấn trắng và tiêu diệt con trưởng thành.

Những vùng có nguy cơ cáo tiêu bọ phấn trắng bằng thuốc bảo vệ thực vật giai đoạn ấu trùng.

Các hoạt chất có tính lưu dẫn là Dinotefuran và Pymetrozine liều lượng và nồng độ sử dụng theo đúng hướng dân của nhà sản xuất.

Những diện tích bị nhiễm bệnh khảm lá nặng, tiến hành tiêu hủy nguồn bệnh bằng cách thu gom cây nhiễm bệnh đem chôn hoặc đốt và xử lý vôi bột không được trồng lại sắn ít nhất 1 vụ và luân canh với các loại cây trồng khác như đậu, đỗ, ngô,..

Đề nghị Công chức Địa chính - Xây dựng - ĐT&MT thị trấn; Trưởng các Tổ dân phố, Trưởng các làng, có diện tích trồng sắn vụ Đông xuân năm 2021-2022 tiến hành phổ biến, tuyên truyền tác hại của bệnh khảm lá virus trên địa bàn, tăng cường các biện pháp phòng chống ngay từ đầu vụ, nhằm hạn chế thiệt hại gây ra và triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng trừ như đã hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực Đảng ủy TT;
- Thường trực HĐND TT;
- Lãnh đạo UBND TT;
- Mặt trận và các tổ chức Đoàn thể TT;
- Công chức Văn hóa - Xã hội *(phụ trách lĩnh vực Thông tin - Thể dục và thể thao);*
- Lưu: VT, Tuấn, Hương(TP).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D TRẤN ĐAK PƠ H.ĐAK PƠ T.GIA LAI

Bùi Duy Nhất